

Zgłosić się w wyznaczonym terminie na Izbę Przyjęć NA CZCZO około godziny 10-tej z 4 litrami wody mineralnej niegazowanej.

**3 dni** przed przyjęciem dieta płynna. BEZMLECZNA.

TEL. ODDZIAŁOWY – 32 3308328

Skierowanie winno być:

- tytułowane do oddziału geriatry (a nie pracowni endoskopii) z prośbą o diagnostykę i leczenie (a nie wykonanie kolonoskopii)
- wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przyjęciem

Lekarz przyjmujący może zweryfikować zasadność skierowania i wobec braku wskazań odmówić przyjęcia.

### **Odstawianie leków upośledzających krzepnięcie:**

#### Leki przeciwplatekcyjne:

1. kwas acetylosalicylowy (**Aspiryna, Acard, Polocard**) – nie wymagają odstawienia
2. klopidogrel (**Clopidogrel, Plavix, Areplex, Agregex, Carder, Clopidix, Grepid, Pegorel**), tikagregol (**Brilique**), pasugrel (**Efient**) wymagają odstawienia i zmiany na Acard z wyjątkiem dwóch sytuacji:
  - koronarografia + stent metalowy w ciągu miesiąca poprzedzającego kolonoskopię
  - koronarografia + stent uwalniający lek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kolonoskopię

#### Leki przeciwkrzepliwne:

1. Doustne antagoniści witaminy K- VKA (**Warfin, Acenokumarol, Sintrom**)
  - przerwij lek 5 dni przed kolonoskopią
  - sprawdź czy INR przed badaniem wynosi  $<1,5$
  - powrót do stosowania leku w stosowanej wcześniej dawce w dniu badania – kontrola INR po tygodniu

!!! Metalowa proteza zastawkowa w pozycji mitralnej lub jakakolwiek sztuczna zastawka i migotanie przedsionków lub incydent zakrzepowo-zatorowy w ciągu trzech miesięcy przed kolonoskopią:

  - zalecana terapia pomostowa heparyną drobnocząsteczkową przed 5 dni (ostatnią dawkę należy przyjąć na 12 godzin przed kolonoskopią)
  - powrót do stosowania leku w stosowanej wcześniej dawce w dniu badania
  - do czasu uzyskania terapeutycznego INR terapia łączona VKA i heparyną drobnocząsteczkową

Rozpoznana trombofilia – konsultacja hematologiczna

#### 2. Nowe leki przeciwkrzepliwne:

- Dabigatran (**Pradaxa, Telexer, Mirexan**) – ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed kolonoskopią lub 72 godziny jeśli eGFR 30-50ml/min
- Rywaroksaban (**Xarelto, Xiltess, Zarixa, Rixacam, Mibrex, Kardatuxan**) – ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed kolonoskopią
- **Eliquis** – ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed kolonoskopią